PROTOCOLO e JUSTIFICATIVA PARA PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE AMOXICILINA 500 mg + CLAVULANATO 125 mg

Obrigatório o preenchimento total de forma legível e apresentação juntamente com a prescrição médica (em duas vias) na farmácia.

Uso exclusivo conforme justificativa da indicação e receita SUS.

Paciente: _____Matricula:_____ Data de Nascimento:_____ CID ou diagnóstico principal:_____
Medicamento requisitado: Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potásssio 125 mg - comprimido.
Quantidade: _____ Posologia de uso:_____

Justificativa da indicação[6]:
□ Falha no tratamento de 1ª. Escolha para Otite Média ou Rinossinusite aguda bacteriana ou faringotonsilites bacteriana[1, 3]
Qual medicamento utilizado inicialmente: _____ Tempo: _____
□ Mordedura de animais[5]
□ Pielonefrite [4]
□ Antibiograma – microrganismo sensível_____
□ Outra:
_____

Data: ____/____/____ Assinatura e carimbo do médico:_____
Justificativa aceita pela Secretaria Municipal de Saúde? □ Sim □ Não

Se não, especificar motivo:_____

Assinatura e carimbo farmacêutico dispensador: _____

ATENÇÃO

Médicos:

Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potásssio 125 mg é contraindicado para pacientes com história de reações alérgicas, hipersensibilidade a penicilinas e disfunção hepática/icterícia associadas a este medicamento ou a outras penicilinas. Deve-se dar atenção à possível sensibilidade cruzada com outros antibióticos betalactâmicos, como as cefalosporinas.

ORIENTAÇÕES GERAIS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE POSOLOGIA[2]

Tabela posológica de Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potásssio 125 mg		
Idade	Apresentação	Dosagem
Adultos e crianças acima de 12 anos	* Comprimidos revestidos de 500 mg + 125 mg	1 comprimido três vezes ao dia

* A posologia deve ser aumentada a critério médico, nos casos de infecções graves, usando-se até 50 mg/kg/dia, divididos, de 8 em 8 horas. ** Cada dose de 25 mg do medicamento fornece 20 mg de amoxicilina e 5 mg de ácido clavulânico. Os comprimidos deste medicamento não são recomendados para crianças menores de 12 anos.

Serão considerados tratamentos de primeira escolha para Infecções das Vias Aeres Superiores: Penicilinas e derivados, cefalosporinas de primeira geração.